



KRÁTKÁ SDĚLENÍ

Nálezy rejska horského (*Sorex alpinus*) u Nového Města nad Metují.

Tomáš Bělka, Týniště nad Orlicí
Josef Vrána, Náchod

Rejskek horský (*Sorex alpinus*) obývá ve východních Čechách pohraniční pohoří (Anděra, Vohralík, 1982; Rybář 1989, Sklenář, Roček, 1977, Vohralík, Anděra, 1972 apod.). Nejníže byl dosud zjištěn Vohralíkem a Anděrou (l. c) v podhůří Orlických hor u Lukavice (370 m. n. m.) a Liberka (410 m. n. m.). Při zoologickém průzkumu navrhované PR Pekelské údolí (okres Náchod, kvadrant 5663) jsme prokázali výskyt rejska horského na další východočeské lokalitě.

Dne 11. 4. 1992 jsme našli jeden mrtvý exemplář, který byl vyplaven na kamenitý břeh řeky Metuje, v nadmořské výšce 310 m. Okolní skalnatá stráň je porostlá přestárlým jedlovým lesem. Lokalita se nachází přibližně 1 km severně od Nového Města nad Metují.

Druhý exemplář byl nalezen 31. 5. 1992. Kadaver rejska ležel na lesní cestě na pravém břehu řeky Metuje nedaleko od osady Peklo (325 m. n. m.). Okolní biotop je zcela odlišný od předcházející lokality. Tvoří jej 20-letý smrkový porost, který přechází v asi 90-letý smrkový les. Okolní svahy jsou i zde velmi příkré a skalnaté.

Pekelské údolí je tvořeno hlubokými zalesněnými kaňony řek Metuje a Olešenky, táhne se od Náchoda a Nového Hrádku až k Novému Městu nad Metují. Na východě je od Orlických hor odděleno podhorskými loukami, z ostatních stran je obklopeno kulturní zemědělskou krajinou. Místní populace rejska horského je tedy od ostatních pravděpodobně zcela izolována. Přesto zde nalézá vhodné životní prostředí. Podle Anděry a Horáčka (1982) to jsou zejména chladné vlhké bukové, popřípadě jedlo-bukové porosty. Tyto podmínky Pekelské údolí bezesporu splňuje.

Souhrn.

Ve dnech 11. 4. a 31. 5. 1992 byli na lokalitě Pekelské údolí (okres Náchod, kvadrant 5663) nalezeni v nadmořských výškách 310 a 325 metrů dva mrtví jedinci rejska horského (*Sorex alpinus*).

SUMMARY

Occurrence of the Alpine Shrew (*Sorex alpinus*) near Nové Město nad Metují.

On 14th April and 31st May, 1992, two dead specimens of the Alpine Shrew (*Sorex alpinus*) were found at the Pekelské údolí (District of Náchod, square 5663 in the International Network for Plant and Animal Occurrence Mapping). The sites are at 310 m, 325 m a. s. l. respectively.

Literatura.

- Anděra M., Horáček I., 1982: Poznáváme naše savce. Praha. SZN.
Anděra M., Vohralík V., 1982: Savci Broumova. Lynx 21: 15 - 39.
Rybář P., 1989: Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. Hradec Králové, Kruh.
Sklenář J., Roček Z., 1977: Příroda Orlických hor a Podorlicka. Praha. SZN.
Vohralík V., Anděra M., 1972 : Rozšíření rejska horského (*Sorex alpinus*) v Čechách. Lynx 13: 56 - 65.

Adresy autorů : Bělka Tomáš, Družstevní 918, 517 21 Týniště nad Orlicí.
Vrána Josef, Borská 1850, 547 01 Náchod.